



Manuale BLS-D e PBLIS-D per i cittadini

CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE ED USO DEL DEFIBRILLATORE
Secondo le raccomandazioni ILCOR 2015

OBIETTIVI

- Saper valutare la vittima
- Saper eseguire compressioni toraciche di alta qualità
- Saper utilizzare il DAE in sicurezza
- Gestire l'ostruzione delle vie aeree

NEL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO

RAZIONALE

In Europa ***ogni 45 secondi*** si verifica un arresto cardiaco.

È di estrema importanza iniziare la RCP entro i primi minuti dall'ACC (*tre minuti di platino*).

Ruolo fondamentale del *primo soccorritore*.

La rianimazione ed il precoce utilizzo del defibrillatore possono aumentare la sopravvivenza fino al 50-70%.

CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

vittima adulta



112-118



RCP



DAE



SOCCORSO AVANZATO

SICUREZZA



Non risponde



Non respira normalmente

Segni vitali assenti



Chiamata d'emergenza 112/118



30 Compressioni toraciche



2 Ventilazioni



RCP 30:2



Appena il DAE è disponibile: accenderlo e seguire le istruzioni

SICUREZZA



Coscienza

A



Vie aeree

A



Attività Respiratoria e Circolo



GUARDO

ASCOLTO

SENTO

B

C


MO.TO.RE.
MOVimento
TOsse REspiro

MASSIMO 10 SECONDI

Chiamata d'emergenza

112/118





30 COMPRESSIONI

5-6 cm PROFONDITÀ

100-120 FREQUENZA

Ventilazioni






RCP 30:2 FINO ALL'ARRIVO DEL DAE



Defibrillatore (DAE)




- **Accendere il DAE**
- **Posizionare gli elettrodi**
- **Seguire le indicazioni vocali**

SICUREZZA

“IO SONO VIA, TU SEI VIA, TUTTI SONO VIA!”




SHOCK INDICATO




SHOCK NON INDICATO



CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA in età pediatrica





Le compressioni toraciche

BAMBINO

30 COMPRESSIONI

circa **5** cm PROFONDITÀ

100-120 FREQUENZA



LATTANTE

30 COMPRESSIONI

circa **4** cm PROFONDITÀ

100-120 FREQUENZA



Defibrillatore (DAE) in età pediatrica

- **ETÀ <1 ANNO** usa solo i defibrillatori in modalità pediatrica.
- **ETÀ 1-8 ANNI** usa le piastre pediatriche/attiva la modalità pediatrica se l'apparecchio lo consente (altrimenti usa il DAE in modalità adulto).
- **ETÀ >8 ANNI** usa il DAE in modalità adulto.

Ostruzione delle Vie Aeree


VITTIMA ADULTO



Posizione laterale di sicurezza

SOLO SE DEVO ALLONTANARMI

**VITTIMA NON COSCIENTE, CHE RESPIRA
NORMALMENTE**



Ostruzione delle Vie Aeree

VITTIMA IN ETÀ PEDIATRICA



CONCLUSIONI

**È DI ESTREMA IMPORTANZA INIZIARE LA RCP
ENTRO I PRIMI MINUTI DALL'ACC.**

Ruolo fondamentale del *PRIMO SOCCORRITORE*.

La rianimazione ed il precoce utilizzo del defibrillatore possono aumentare la sopravvivenza fino al 50-70%.

La presente pubblicazione, realizzata da ARES 118, è consultabile e scaricabile in forma assolutamente gratuita. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera, in ogni forma e con ogni mezzo.